

ФГБОУ ВО КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЧЕНИЕ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У НОВОРΟЖДЕННЫХ ПОСЛЕ ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ

Выполнила: ординатор кафедры акушерство и
гинекология, Лысенко Ю.Ю.

Руководитель: к.м.н, доцент кафедры Рудаева Е.В.



В последние годы отмечается тенденция к увеличению частоты индуцированных родов, в развитых странах их частота достигает 25%. Индуцированные роды сопровождаются не только акушерскими осложнениями, но и увеличивают время нахождения новорожденного в стационаре, а также ухудшают их неврологический статус.

Цель исследования:

изучить состояние новорожденных при индуцированных родах.

Материалы и методы исследования:

Проведено ретроспективное исследование «случай-контроль» 225 историй родов и историй развития новорожденных за 2018-2019 года по данным родильного дома № 1 ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского».

Основную группу составили 225 женщин с индуцированными родами и их новорожденные, группу сравнения – 225 женщин с самопроизвольными родами и их новорожденные.

Проводилась оценка методов родовозбуждения, исходов родов, величины кровопотери, частоты осложнений, состояние здоровья новорожденных.

Критерии включения и исключения:

Группа 1 (N=225):

Критерии включения –беременные с
программированными родами


Критерии исключения –наличие многоплодной
беременности, тяжелая соматическая патология, вредные
привычки у женщин, ИППП, ВПР, наличие показаний к
абдоминальному методу родоразрешения

Группа 2 (N=225):


Критерии включения –самопроизвольные роды

Критерии исключения – тяжелая соматическая патология,
вредные привычки, ИППП, ВПР, наличие показаний к
абдоминальному методу родоразрешения


Осложнения настоящей беременности




Осложнения в родах и послеродовом периоде



Показания для родовозбуждения




Оценка по Апгар новорожденных




Самопроизвольные роды Индуцированные роды

достоверно $p < 0,05$

Антропометрические данные новорожденных




Диагноз новорожденного



* Статистически достоверно $p < 0,5$

Гистопатологическое исследование плаценты



* статистически достоверно $p < 0,5$

Заключение

Индукцированные роды достоверно чаще вызывают частоту осложнений неонатального периода и увеличивают время пребывания новорожденных в стационаре.