



Федеральное государственное общеобразовательное
учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный медицинский
университет»
Минздрава России

Кафедра акушерства и гинекологии им. профессора
Г.А.Ушаковой

ФАКТОРЫ РИСКА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ КРОВОПОТЕРИ У ПАЦИЕНТОК, РОДОРАЗРЕШЕННЫХ В СТАЦИОНАРЕ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ


Кемерово, 2020

Выполнила:
Студентка группы №1601
Медведева К.Ю
Научный руководитель:
к.м.н, доцент. Марочко Т. Ю

Акушерские кровотечения - одна из ведущих причин материнской смертности (18,6% в структуре МС в 2018 году)

Цель исследования

Выявить факторы риска патологической кровопотери у пациенток, родоразрешенных в стационаре третьего уровня.



Дизайн исследования:

Ретроспективное исследование «случай-контроль»

Материалы и методы:

100 историй родов женщин, родоразрешенных в клиническом перинатальном центре им. Л.А. Решетовой Кемеровской областной клинической больницы им. С.В. Беяева в 2018-2019 гг

I (основная) группа

50 пациенток с патологической кровопотерей (более 1000 мл).

II (контрольная) группа

50 женщин с физиологической кровопотерей в родах.


Общая характеристика исследуемых групп

Признак	Основная группа	Контрольная группа	P
Средний возраст	33,58±6,59 лет	30,36±5,13 лет	p=0,7
Старше 40 лет	9 пациенток (18%)	1 пациентка (2 %)	p=0,027
Аборты в анамнезе	34 пациентки (68%)	18 пациенток (36%)	p=0,002
Среднее количество абортов	2,12±1,13	1,77±1,35	p=0,843

Социальный портрет исследуемых




Течение настоящей беременности




Метод родоразрешения

Основная группа



- Через естественные родовые пути
- КС плановое
- КС экстренное

Контрольная группа



- Через естественные родовые пути
- КС плановое
- КС экстренное

Выявленные факторы риска

Признак	I группа	II группа	Значение
Возраст > 40 лет	9 (18%)	1 (2%)	OR=10,75; [1,3-88,4]; p<0,05
Аборт в анамнезе	34 (68%)	18 (36%)	OR=3,77; [1,6-8,6]; p<0,05
Предлежание плаценты	30 (60%)	0 (0%)	OR=150,26; [8,7-2575,1]; p<0,05
Врастание плаценты	20 (40%)	0 (0%)	OR=67,88; [3,9-1163,3]; p<0,05
ПОНРП	14 (28%)	0 (0%)	OR=40,12; [2,3-694,4]; p<0,05
Преждевременные роды	21 (42%)	6 (12%)	OR=5,31; [1,9-14,7]; p<0,05
Кесарево сечение	45 (90%)	22 (44%)	OR=11,45; [3,8-33,7]; p<0,05

Выводы

Таким образом, факторами риска патологической кровопотери у пациенток, родоразрешенных в стационаре третьего уровня являются:

- возраст старше 40 лет
- наличие в анамнезе аборт
- предлежание плаценты
- врастание плаценты
- преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
- преждевременные роды
- родоразрешение путем операции кесарева сечения

A pregnant woman with long brown hair, wearing a white t-shirt and grey leggings, is sitting and gently holding her belly with both hands. The background is a soft, out-of-focus blue and white, suggesting a window with curtains. The text "Спасибо за внимание!" is overlaid on the right side of the image in a white, stylized font with a blue outline.

Спасибо за
внимание!