

*Кафедра хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии
с курсом офтальмологии,
Кемеровский государственный медицинский университет.*

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТСЛОЙКОЙ СЕТЧАТКИ

Вершинина Н.А., Янченко Т.В.

Научный руководитель:

д.м.н., профессор Е.В. Громакина

Кемерово, 2020

Актуальность проблемы:

- Частота встречаемости отслойки сетчатки, по данным разных авторов, в популяции колеблется от 8,9 до 24,4 случая в год на 100 000 населения.
- *Предрасполагающие факторы:* отслойка сетчатки в парном глазу, афакия или артифакия, миопия высокой степени, системные заболевания.

Цель исследования:



Провести анализ клинико-анамнестических данных пациентов с отслойкой сетчатки различной этиологии.

Дизайн исследования

Пациенты КОКОБ с диагнозом «Отслойка сетчатки»

n = 480 человек

Средний возраст – 55 лет



Мужчины

n = 188 человек

Средний возраст – 50 лет



Женщины

n = 292 человека

Средний возраст – 58 лет

*Предрасполагающие
факторы:*

- рефракция;
- афакия/артифакия;
- наличие общих заболеваний.

*Провоцирующие
факторы:*

- физическая нагрузка;
- травма;
- инфекции глаз.

Предрасполагающие факторы

Миопическая рефракция

n = 192 человека



Предрасполагающие факторы


Экстракция катаракты

Средний возраст пациентов – 58 лет



Предрасполагающие факторы

Соматические заболевания



Провоцирующие факторы

Год	Пол	Физические нагрузки	Травма	Инфекции
2015	муж	14	36	4
	жен	19	13	0
2016	муж	0	24	1
	жен	6	12	0

Выводы:

- Отслойка сетчатки чаще всего развивается в трудоспособном возрасте (средний возраст 55 лет).
- Частота возникновения отслойки сетчатки зависит от наличия соматических заболеваний и степени миопической рефракции.
- Наличие артифакии и афакии многократно повышает вероятность формирования отслойки сетчатки.
- Травматический фактор, физическую нагрузку и инфекции можно считать провоцирующими факторами развития отслойки сетчатки.