

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ**

**ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ У МУЖЧИН С
ПЕРВИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ**

Алиев Бурхан Артурович

**Научный руководитель:
д.м.н., проф. Абдуллаева В.К.**

Актуальность

Бесплодие как проблема объединяет в себе не только физическое, но психологическое и социальное неблагополучие пары. За последнее время значительно повысился интерес к мужскому бесплодию, что связано с расширением методов исследования для распознавания этого заболевания. При этом результаты данных исследований показали, что бесплодие у мужчин встречается значительно чаще, чем это принято было раньше думать. Среди причин идиопатического бесплодия могут рассматриваться психологические факторы, в том числе особенности взаимоотношений в паре, касающиеся семейного и сексуального благополучия. Психогенное бесплодие у мужчин может проявляться следующими симптомами: активной половой жизнью с постоянным ожиданием наступления зачатия, занижением самооценки и чувством неполноценности, дисгармоничными отношениями между супругами.



Цель исследования

изучить особенности копинг стратегий мужчин с первичным бесплодием, для своевременного оказания медико-психологической помощи пациентам иммунологического профиля и превенции развития психоэмоциональных изменений на самых ранних этапах их формирования.

Материалы и методы исследования

Количество всех обследованных за
2022-2023 год $n = 140$

Основная $n=140$

Контроль $n=70$

Методы исследования


Клинико-
инструментальн
ые

Экспериментально-
психологические
(Spielberger-Hanin, HADS,
тест на акцентуацию
Леонгарда Шмишека)

Иммуноло-
гические

Статистические

Возраст и длительность бесплодного брака обследуемых мужчин




Основная

Контроль

■ Основная

■ Контроль




■ 1-3 г.


■ 3-5 г.

■ больше 5 лет


Оценка соматического здоровья и вредных привычек мужчин с



Анализ спермограммы у обследованных пациентов идиопатическим бесплодием




Характеристика инфекционного статуса обследованных



Уровень гормонов у мужчин с идиопатическим бесплодием



Уровни АСАТ у пациентов с идиопатическим бесплодием




Факторы развития психоэмоциональных расстройств


- Бездетность
- Лечение бесплодия
- Смерть или болезнь близких родственников
- Жизненные проблемы



ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У МУЖЧИН ОСНОВНОЙ ГРУППЫ




ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ




- гармоничная
- дисфункциональная
- деструктивная
- амбивалентная

СТРУКТУРА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ



- Тревожные реакции
- Тревожно-депрессивные реакции
- Депрессивные реакции
- Невротические реакции

Результаты изучения тяжести депрессивной симптоматики



ВЫВОДЫ

1. Выявлено влияние мужской инфертильности на формирование психоэмоциональных нарушений у лиц, страдающих мужским бесплодием, в большей мере наблюдаются тревожно-депрессивные расстройства, а в меньшей степени у пациентов регистрируется фобическая и дисфорическая симптоматика.
2. Установлено, что с утяжелением клинических проявлений мужской инфертильности прогрессирует усиление уровня тревожности, достигающие максимальных значений при высоких показателях олигоспермии.



3. Определено, что у мужчин, страдающих первичным бесплодием, наблюдается высокий уровень напряженности механизмов психологической защиты (согласно тесту Плутчика, Келлермана, Конте - Методика Индекс жизненного стиля). По всем шкалам в суммарной оценке были получены высокие баллы (ОСП1 – 55,9; ОСП2– 56,5; ОСП3 – 54,8), при этом доминирующими являются механизмы совладающего поведения по типу отрицание, подавление и регрессия.

4. Наличие мужской инфертильности сопровождается снижением показателей физической составляющей качества жизни пациентов иммунологического профиля, по психическому здоровью и социальной активности регистрируются значительные отличия от нормативных данных по сравнению со здоровой популяцией и ухудшение показателей качества жизни в зависимости от формы мужского бесплодия.